



# 局部麻醉指导

这个简要概述是关于在打针和手术时，最常用的局部麻醉药。您要经常跟您的医生沟通，看哪一种最适合您的孩子。

| 产品                         | 可用性*       | 我能怎么用？                                              | 提前多久？          | 还有什么应该注意的                                                     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>膏</b><br><b>LMX</b>     | 药店或网上的非处方药 | 不要先擦皮肤（天然油会帮吸收。涂一点点，完全抹匀。接下来，涂一大块但不要抹。用塑料套把它盖住。     | <b>30分钟</b>    | 您应该涂在不同的地方，这样能选针戳的位置。不会把血管变小。随身带着好！                           |
| <b>膏</b><br><b>EMLA</b>    | 通过处方       | 不要先擦皮肤（天然油会帮吸收。涂一点点，完全抹匀。接下来，涂一大块但不要抹。用塑料套把它盖住。     | <b>60分钟</b>    | 您应该涂在不同的地方，这样能选针戳的位置。提前给医务人员打电话要处方。                           |
| <b>贴膏</b><br><b>SYNERA</b> | 通过处方       | 剥，像创可贴贴。                                            | <b>20-30分钟</b> | 有可能会贵，但网上经常会有优惠券。对验血好，因为会把血管变大。提前给医务人员打电话要处方。                 |
| <b>系统</b><br><b>J-TIP</b>  | 医务人员       | 麻木皮肤也可以不用针，就用压缩的二氧化碳气将利多卡因压进皮肤的上面几层。医务人员做的时候会有啪的声音。 | <b>1-2分钟</b>   | 你去买的地方有可能没有这种药，所以提前给他们打电话问有没有。这个药很快就能见效，所以没有那么多时间时，它是一个很好的选择。 |

\*有些产品的可用性会取决于您的地点。  
需要更多详细的信息，请到：[megfoundationforpain.org](http://megfoundationforpain.org)



**Meg Foundation**  
MEGFUNDATIONFORPAIN.ORG