

Si aún no he alcanzado la meta, ¿está mi corazón realmente protegido?

Mantener una HbA1c >7% se asocia con un aumento sustancial del riesgo cardiovascular y la mortalidad.

Cada
↑1%
de aumento
de HbA1c²



Riesgo incrementado en²:
38%
Evento macrovascular




38%
Muerte

Una parcela significativa de los pacientes tratados con iSGLT2 puede **NECESITAR DE TERAPIA COMBINADA** para alcanzar sus metas.^{3, 4}

La adición de **EVOGLIPTINA** favorece el **ALCANCE DE LAS METAS DE CONTROL.**⁵

Terapia triple Evogliptina + Dapagliflozina + Metformina
Más pacientes alcanzaron la meta de HbA1c (<7%)^{5a}

Proporción de pacientes (%) con HbA1c <7% a la semana 24



4X

Más pacientes alcanzaron HbA1c <7% con evogliptina vs placebo en la semana 24 (40% vs 10%; RR 4,00; OR 8,28; IC del 95% 4,15-16,51; p <0,0001)^{5a}

Adaptado de Moon JS et al. Diabetes Metab J. 2023 Nov.

<7%

**METAS DE CONTROL
DE HbA1c**
de acuerdo a la ADA.^{1*}



La simplicidad de ser efectivo y seguro.⁵⁻¹⁰

SUGANON®
Evogliptina 5mg

¡Ahora sí estoy más protegido!

Con Suganon, los pacientes alcanzan sus metas glucémicas con seguridad cardiovascular.⁵⁻¹⁰

- 🕒 **Control glucémico sostenido**
en monoterapia, terapia dual o triple, con múltiples agentes.
- 🛡️ **Seguridad cardiovascular.**
- 🕒 **Una dosis única diaria.**

<7% METAS DE CONTROL DE HbA1c de acuerdo a la ADA.*



Suganon: control glucémico sostenido con seguridad cardiovascular.⁵⁻¹⁰

ADA: Asociación Americana de Diabetes; **OR:** razón de probabilidades. *Meta de <7% en adultos sin hipoglucemia significativa. No aplica para embarazadas y debe integrarse a una estrategia centrada en cada paciente. aEnsayo de fase 3 aleatorizado, multicéntrico y controlado con placebo investigó la eficacia y seguridad a largo plazo de la adición de evogliptina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 inadecuadamente controlada que recibieron previamente una combinación de dapagliflozina y metformina. Los datos son expresados como media e intervalo de confianza (IC) del 95%. bSe refiere al riesgo relativo calculado a partir del 40% vs 10%.
Referencias: 1. American Diabetes Association. (2024). Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 2024;47(Suppl. 1):S111–S125; 2. Zoungas, S, et al. Association of HbA1c levels with vascular complications and death in patients with type 2 diabetes: evidence of glycaemic thresholds. Diabetologia 55, 636–643 (2012); 3. Vasilakou D, Karagiannis T, Athanasiadou E, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2013 Aug 20;159(4):262–74; 4. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025 Jan 1;48(1 Suppl 1):S181–S206; 5. Moon, JS, et al. Efficacy and Safety of Evogliptin Add-on Therapy to Dapagliflozin/Metformin Combinations in Patients with Poorly Controlled Type 2 Diabetes Mellitus: A 24-Week Multicenter Randomized Placebo-Controlled Parallel-Phase 3 Trial with a 28-Week Extension. Diabetes Metab J. 2023 Nov;47(6):808–817; 6. Park S, et al Cardiovascular safety of evogliptin dual and triple therapy in patients with type 2 diabetes: a nationwide cohort study. BMJ Open 2024;14:e0077084; 7. Park J, et al. Efficacy and safety of evogliptin monotherapy in patients with type 2 diabetes and moderately elevated glycosylated haemoglobin levels after diet and exercise. Diabetes Obs Metab. 2017 Dec;19(12):1681–1687; 8. Tang Q, Pan W, Peng L. The efficacy and safety of evogliptin for type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Aug 19;13:962385; 9. Oh H, Nguyen HD, Yoon IM, Kim MS. Efficacy and Tolerability of Evogliptin in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-analysis with Bayesian Inference Through a Quality-management System. Clin Ther. 2021 Aug;43(8):1336–1355; 10. Información para prescribir de Suganon.

Material de uso exclusivo de profesionales habilitados para prescribir o dispensar medicamentos.

15/07/26

