



INFORMACIÓN PARA PACIENTES

RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS FARINGOLARÍNGEOS


FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ


falp
Juntos contra el cáncer

¿Cuándo debo realizarme una reconstrucción de defectos faringolaríngeos?

La reconstrucción de defectos faringolaríngeos es una cirugía que se realiza en personas que se han sometido a una cirugía primaria en la que se ha removido parcial o totalmente la faringe y/o laringe, como tratamiento del cáncer en esa zona.

La faringe y laringe forman parte del tubo digestivo. Entonces, cuando hay una resección de la faringe y/o de la laringe, se interrumpe la continuidad del tubo digestivo a ese nivel. Por ello, las personas que se realizan una resección de esta parte no pueden alimentarse por la boca, teniendo que usar una sonda de gastrostomía. Esta sonda de gastrostomía queda instalada en el abdomen y le permite nutrirse adecuadamente, pero no puede disfrutar de la alimentación por boca, privándose de degustar los alimentos.



¿Para qué se realiza una reconstrucción de defectos faringolaríngeos?

Esta cirugía se realiza para devolver la continuidad al tubo digestivo. Con ello, podrá deglutir (tragar líquidos y alimentos). Esta cirugía no garantiza que usted recobrará la fonación, es decir, su capacidad de hablar como antes de la cirugía primaria.

¿En qué consiste la reconstrucción de defectos faringolaríngeos?

Esta cirugía se realiza principalmente con el uso de colgajos. Estos son tejidos que vienen de otras partes del cuerpo (zona dadora). Este colgajo se une en la zona del cuello (zona receptora) y sirve para reparar y darle continuidad al tubo digestivo.

Algunas de las zonas dadoras pueden ser músculos y piel vecina, como la región del tórax, o pueden ser tejidos de zonas más alejadas, lo que se conoce como colgajos libres.

La selección del método dependerá de la magnitud y localización del defecto que deje la cirugía primaria.

Para asegurar que la cirugía cumpla con su propósito, es necesario que usted realice sesiones de rehabilitación con un(a) fonoaudiólogo(a) especialista, quien le ayudará a recuperar la deglución y eventualmente el habla.

¿Qué factores debo considerar al decidir realizarme la reconstrucción de defectos faringolaríngeos?

El principal beneficio de esta cirugía es mejorar la función de la zona intervenida, lo que permitirá tragar y alimentarse por boca, disfrutando la alimentación.

Como en toda cirugía, existen riesgos asociados a la reconstrucción de defectos faringolaríngeos. Entre los más importantes se encuentran:

- 1 Sangramiento de la zona dadora y la zona receptora.
- 2 Falla de la circulación del tejido usado para la reparación (colgajo), lo que puede significar otra cirugía para repetir la reparación.
- 3 Acumulación de líquido en las zonas de cirugía (conocida como colección de fluidos).
- 4 Infección en la zona operatoria.
- 5 Filtración de saliva, lo que puede producir un retardo en la cicatrización, infecciones, inflamación de arterias que pueden romperse e incluso riesgo de muerte.
- 6 Rigidez del cuello o disminución de la movilidad de la zona.

¿Cuál es el tiempo de recuperación luego de la reconstrucción de defectos faringolaríngeos?

El tiempo es muy variable. Si no presenta complicaciones de la cirugía, es probable que en un mes usted pueda comenzar a tragar alimentos. Los resultados finales de la cirugía pueden demorar entre 6 y 24 meses, tiempo en el que podrá observar la mejora en la funcionalidad de su deglución.

¿Cómo debo prepararme para una reconstrucción de defectos faringolaríngeos?

Toda cirugía requiere de preparación para asegurar que está en óptimas condiciones al momento de realizársela. El equipo de salud le entregará las indicaciones específicas de exámenes de sangre y tiempo de ayuno necesarios para su cirugía.

Es posible que usted requiera de un entrenamiento previo a la cirugía para que tenga una mejor percepción de cómo deglutir. Esto facilitará el trabajo en la rehabilitación post-operatoria. Específicamente, el entrenamiento consiste en ejercicios de movilidad de la lengua y de sensibilidad de la región faríngea. En esta preparación debe acompañarle un profesional fonoaudiólogo especializado en esta materia.

¿Tiene preguntas?

Escríbalas aquí para que las comparta con su equipo de salud.

[illegible]

Autores

Dr. Luis Marín, Subdirector Médico de Cirugía Oncológica FALP.
Con el apoyo de la Dirección de Participación en Salud.

CONTACTO

☎ 800 24 8000 y desde celulares 2 2712 8000

📍 José Manuel Infante 805, Providencia, Santiago

🌐 www.falp.cl

