

# AFRIKKALAINEN SIKARUTTO LEVIÄÄ

– tautiuhkaan varautuminen sikatilalla



## Afrikkalainen sikarutto (ASF)

- Villisikojen ja sikojen verenvuotokuume
- Ei tartu ihmiseen
- Tautiin sairastuneiden sikojen kuolleisuus jopa 100 %
- Tautiin ei ole olemassa hoitoa tai rokotetta
- Lakisääteisesti vastustettava eläintauti (A-luokka)

**Epäilytilanteessa  
tulee ottaa  
välittömästi yhteyttä  
eläinlääkäriin!**



## ASF-tartuntaa uskallettava epäillä

Taudin tunnistaminen aikaisessa vaiheessa edellyttää epäilyä ja näytteenottoa matalalla kynnyksellä. Alkuvaiheessa sikalassa on todennäköisesti vain yksittäisiä sairastuneita sikojä ja oireet voivat olla lieviä.

Aina, kun sikojen iholla tai korvissa on selvästi havaittavia verenvuotauksia, tulee epäillä afrikkalaista sikaruttoa.

### TYYPILLISIÄ OIREITA

- Korkea kuume (yli 40,5 °C)
- Ihonalaisia verenvuotauksia ja turvotusta erityisesti korvissa ja raajoissa
- Hengitysvaikeudet, silmä- ja sierainvuoto
- Oksentelu, ummetus, verinen ripuli
- Emakoilla luomisia
- Tyypillisiä myös äkilliset kuolemat ilman edeltäviä oireita



# Leviäminen

ASF-virusta erittyy kaikkiin sairastuneen sian tai villisian eritteisiin. Veressä ja kuolleen eläimen ruhosssa virus säilyy jopa useita kuukausia.

## Afrikkalainen sikarutto voi levitä

### SUORAAN

- Tartunnan saaneista ja tautiin kuolleista sioista ja villisioista terveisiin sikoihin ja villisikoihin

### EPÄSUORASTI

- Saastuneiden välineiden, vaatteiden, jalkineiden, rehun, kuivikkeiden, kuljetusvälineiden välityksellä
- Sian- tai villisianlihaa sisältävän ruokajätteen välityksellä




# Tautitilanne

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt laajasti Euroopan alueella. Tautitilanne voi muuttua nopeasti, jos tauti pääsee leviämään ihmisten toiminnan seurauksena uusille alueille.

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy muun muassa Virossa, Latviassa, Liettuaassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Italiassa, Saksassa, Tšekissä, Kreikassa, Kroatiaassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Ukrainassa, Serbiassa, Pohjois-Makedoniassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kosovossa, Montenegrossa ja Albaniassa.

Tautia todettiin ensimmäisen kerran Suomessa heinäkuussa 2026 luonnonvaraisissa villisioissa.

**Sian- ja villisianlihaa tai lihatuotteita ei tule tuoda Suomeen ASF-maista.**



Tautitilanne  
voi muuttua  
nopeasti.

# Sikaloiden tautisuojaus kuntoon



Hyvä tautisuojaus on paras keino estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen tilalle! Huolehdi, että kaikki tilan työntekijät ja vierailijat muistavat noudattaa tautisuojauskäytäntöjä.

Tarkempia tautisuojausohjeita löytyy Eläinten terveys ETT ry:n kotisivuilta.

1

## Ruokajätteen syöttäminen sioille on kiellettyä!

- Afrikkalainen sikarutto leviää sian- ja villisianlihan ja lihatuotteiden välityksellä

2

## Käytä aina tautisulkua

- Kaksinkertaista tautisulkua tulee kaikkien käyttää aina sikalaan mennessä
- Pese ja desinfioi kädet sikalaan mennessä
- Huolehdi tautisulusta myös käydessäsi ulkona kesken töiden esimerkiksi raatokontilla

3

## Noudata karenssiaikoja saapuessa ulkomailta Suomeen

- Ulkomailta tullessa pidä 48 tunnin karenssiaika ennen sikalaan menemistä
- Jos käyt ASF-alueella omalla autollasi, pese auto ja erityisesti sen alusta Suomeen palatessasi

4

## Pidä kaikki sikalan ovet lukittuina

- Sikalaan ei saa päästä ylimääräisiä henkilöitä

5

## Älä tuo rehuja ja kuivikkeita ASF-alueilta

- Kuumentamattomat rehut ja kuivikkeet ovat suurin riski taudin leviämiselle
- Älä anna ulkomailta tulleita rehusäkkejä sioille virikkeeksi

6

## Huolehdi haittaeläintorjunnasta

- Pidä sikalan ympäristö siistinä ja avoimena, jolloin se ei houkuttele haittaeläimiä
- Käytä aina tarvittaessa myrkkyjä ja loukkuja haittaeläinten torjuntaan

# Sikatiilojen aitaaminen

Jos afrikkalaista sikaruttoa todetaan Suomessa, vaaditaan tartunta-/rajoitusvyöhykkeelle jäävien sikatiilojen aitaamista. Aitaamiselle on aikaa kuusi kuukautta tartunnan toteamisesta uudella alueella. Kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen sikojen siirtoja rajoitetaan tiukemmin aitaamattomilta tiloilta. Aidan rakentamiseen on nyt mahdollista saada investointitukea.



# Tautitapauksella vakavat seuraukset

Villisioissa todettu tartunta johtaa paikallisesti merkittäviin rajoituksiin.



Luonnonvaraisissa villisioissa todetulla tartunnalla on laajat ja merkittävät vaikutukset paikallisesti, sillä tartunnan leviämisen estämiseksi viranomaisen asettaa paljon rajoituksia.

Tuotantosioilla tartunta aiheuttaa merkittävimmät toimenpiteet tartuntatilalla, mutta se vaikuttaa myös muiden lähialueen sikatilojen toimintaan

## Tautitapausten käytännön seuraukset



### Tartunta sikatilalla

#### TARTUNTATILA

ASF-tartuntatilalla viranomaiset vastaavat taudin hävittämisestä. Tilan kaikki siat lopetetaan ja tilalla tehdään kattavat pesu- ja desinfektioimenpiteet. Valtio maksaa toimenpiteet ja tuottajalle korvataan osa taloudellisista menetyksistä, mutta korvaukset eivät kata kaikkea.

#### RAJOITUSVYÖHYKE

Sikojen pitopaikassa todetun tautitapauksen takia perustetaan **rajoitusvyöhyke**, jonka raja sijaitsee vähintään 10 kilometrin päästä tilalta.

**Sikojen siirtäminen on kiellettyä** rajoitusvyöhykkeellä ilman tiettyjen ehtojen täyttymistä. Ehtojen täyttymiseen kuluu aikaa vähintään 15 vuorokautta. Vyöhykkeellä sijaitsevien **sikatilojen tulee tehostaa tautisuojausta**, johon kuuluu esimerkiksi **tilojen aitaaminen**.

### Tartunta luonnonvaraisissa villisioissa

#### TARTUNTAVYÖHYKE

Luonnonvaraisen villisian tautitapauksen takia perustetaan tartuntavyöhyke, jonka raja sijaitsee enintään 50 kilometrin päässä todetusta tartunnasta. Vyöhykkeen kokoon vaikuttavat alueen villisikojen määrä ja elinalueet sekä alueella sijaitsevat sikatilat.

**Metsästäminen on kiellettyä** tartuntavyöhykkeellä. Kielto koskee villisikojen metsästämisestä lisäksi kaikkea muuta metsästystä. Myös muuta alueella liikkumista rajoitetaan.

**Sikojen siirtäminen on kiellettyä** myös tartuntavyöhykkeellä ilman tiettyjen ehtojen täyttymistä. Ehtojen täyttymiseen kuluu aikaa vähintään 15 vuorokautta. Vyöhykkeellä sijaitsevien **sikatilojen tulee tehostaa tautisuojausta**, johon kuuluu esimerkiksi **tilojen aitaaminen**.



# Tiheä villisikakanta lisää tautiriskiä

Villisikakannan hallinta on erittäin tärkeä osa afrikkalaisen sikaruton vastustusta.

Mitä tiheämpi villisikakanta Suomessa on, sitä todennäköisemmin tartunta säilyy ja leviää luonnonvaraisissa villisioissa. Tiheästä villisikakannasta taudin hävittäminen on äärimmäisen vaikeaa.



## Edistä villisikojen metsästystä paikallisesti

Kannusta metsästäjiä villisikojen metsästämiseen. On hyvä varmistaa, että omilla mailla metsästysmaiden vuokrasopimukseen kuuluu myös oikeus metsästää villisikoja. Tehdyistä villisikahavainnoista tulee heti ilmoittaa paikallisille metsästäjille.

Metsästetyistä villisioista tulee aina lähettää ASF-näytteet Ruokavirastoon. Ruokavirasto maksaa tämän perusteella 50 euron näytelähetyspalkkion ja naarasvillisioista lisäpalkkiota 100 euroa. Suomen Sikayrittäjät ry maksaa metsästysseuroille toiminta-avustusta 185 euroa metsästetystä villisiasta.

**Metsästysmatkoja ei tule tehdä afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueille.**

## Villisioille ei riistarukointaa

Kannan kasvun estämiseksi villisikoja ei tule ruokkia, vaan pieniä määriä rehua voidaan käyttää houkutelutarkoituksessa metsästyksen apuna.

Muiden riistaeläinten ruokinnassa tulee huomioida, etteivät villisiat pääse ruokailemaan näillä ruokinta-paikoilla. Ruokintaan voidaan käyttää rehuja, jotka eivät houkuttele villisikoja (esimerkiksi heinä). Rehu tulisi tarjota ruokinta-automaateista tai katoksista, joista villisiat eivät sitä saa.

## Ilmoita kuolleista ja sairastuneista villisioista

Tärkein keino afrikkalaisen sikaruton havaitsemiseksi, on saada tutkittavaksi kuolleena löytyneitä villisikoja. Kuolleena löydetystä ja sairastuneista villisioista sekä kolarivillisistä tulee ilmoittaa viipymättä alueen virkaeläinlääkärille. Ilmoittamisesta maksetaan 150 euron palkkio, jota tulee hakea Ruokavirastosta.



## Lisätietoa

**Afrikkalainen sikarutto ja ajankohtainen tautitilanne:**

[www.ruokavirasto.fi/asf](http://www.ruokavirasto.fi/asf)

**Tautisuojausohjeita:**

[www.ett.fi/sika/tilatason-tautisuojaus](http://www.ett.fi/sika/tilatason-tautisuojaus)

## Yhteystiedot

**Suomen Sikayrittäjät ry**

toiminnanjohtaja Ari Berg

[ari.berg@sikayrittajat.fi](mailto:ari.berg@sikayrittajat.fi), puh. 040 566 7328

asiantuntijaeläinlääkäri Kati Näsärö

[kati.nasaro@sikayrittajat.fi](mailto:kati.nasaro@sikayrittajat.fi), puh. 050 347 2852

*Esite on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa  
Villisikoista aiheutuvan afrikkalaisen sikaruton riskin pienentäminen.  
Esitteen tiedot perustuvat Ruokaviraston materiaaleihin.*